

# СХЕМА ПОДГОТОВКИ КИШЕЧНИКА ПРЕПАРАТОМ ЛАВАКОЛ®

Раствор готовится из расчета 1 пакетик на 200 мл воды \* Раствор принимать небольшими глотками, по 200 мл с интервалом в 20 минут \* Прием препарата Лавакол® необходимо завершить не позднее чем за 3-4 часа до назначенной процедуры \* Через 1-2 часа после приема раствора появятся позывы к опорожнению кишечника \* Опорожнение кишечника завершится через 1-2 часа после приема последнего пакетика препарата Лавакол® \* Врач может изменить время приема препарата, однако важно соблюсти указанные пропорции и интервалы.

## Одноэтапная подготовка



Процедура  
до 12:00



### За 2-3 дня до исследования

Соблюдение бесшлаковой диеты



### День перед исследованием



15:00

Последний прием пищи



**Допустимо:** прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки без мякоти и жидкости без красного пигмента, негазированная вода, кисель без ягод и зерен



17:00 - 22:00

15 пакетиков препарата Лавакол®  
(3л раствора)



### День исследования

Прием препарата Лавакол®  
не требуется



**Допустимо:** негазированная вода, чай с медом или кисель без мякоти, ягод и зерен.



**При применении общего  
обезболивания необходимо  
быть натощак**

## Двухэтапная подготовка



Процедура  
после 12:00



### За 2-3 дня до исследования

Соблюдение бесшлаковой диеты



### День перед исследованием



17:00

Последний прием пищи



**Допустимо:** прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки без мякоти и жидкости без красного пигмента, негазированная вода, кисель без ягод и зерен



19:00 - 22:00

10 пакетиков препарата Лавакол®  
(2л раствора)



### День исследования



8:00 - 11:00

5 пакетиков препарата Лавакол®  
(1л раствора)



**Допустимо:** негазированная вода, чай с медом или кисель без мякоти, ягод и зерен.



**При применении общего  
обезболивания необходимо  
быть натощак**

**Важно! При наличии симптоматического запора рекомендуется пройти курс лечения препаратом Лавакол® по схеме: 1 пакетик утром или 1 пакетик утром + 1 пакетик вечером (если нет улучшения стула в течении 5-7 дней.)**

Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. За дополнительной информацией обратитесь к врачу. Информация по препарату предоставляется в соответствии с п. 4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления пациента о наличии в обращении аналогичных средств.